

Tabell 3. Fosforgjødselmengde, kg P/daa, ved gitt P_{AL}-nivå for vekstene kål, løk, gulrot, brokkoli, blomkål, kålrot, isbergsalat, purre, stilkselleri og knollselleri.

P _{AL} -verdi (mg P/100 g jord)	Lavt				Optimalt 5-7	Moderat 8-10	Høyt 11-14	Meget høyt 15-19	Svært høyt 20-24	Ekstremt høyt >24
	1	2	3	4						
	kg P pr. daa									
Hvitkål, industri og konsum	6.0	5.3	4.5	3.8	3.0	2.8	2.5	2.2	1.8	1.5
Sommerkål, tidlig mai-juni	5.0	4.4	3.8	3.1	2.5	2.2	1.9	1.6	1.3	1.0
Kepaløk, breigjødset	11.6	10.2	8.7	7.3	5.8	5.4	4.8	4.2	3.6	3.0
Kepaløk, stripegjødset	8.6	7.5	6.5	5.4	4.3	3.9	3.3	2.8	2.3	2.0
Gulrot, industri og konsum	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.6	3.2	2.8	2.4	2.0
Brokkoli og blomkål, sommer/høst	5.6	4.9	4.2	3.5	2.8	2.5	2.3	2.0	1.5	1.0
Brokkoli og blomkål, tidlig	6.6	5.8	5.0	4.1	3.3	3.0	2.8	2.5	2.0	1.5
Kålrot, høst/lagring	5.0	4.4	3.8	3.1	2.5	2.0	1.8	1.5	1.3	1.0
Kålrot, tidlig	6.0	5.3	4.5	3.8	3.0	2.5	2.3	2.0	1.8	1.5
Isbergsalat, sommer/høst	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.8	1.5	1.3	1.0	0.5
Isbergsalat, tidlig	5.0	4.4	3.8	3.1	2.5	2.3	2.0	1.8	1.5	1.0
Purre, høst/fabrikk	9	7.9	6.8	5.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.5	3.0
Purre, tidlig	10	8.8	7.5	6.3	5.0	4.8	4.5	4.2	4.0	3.5
Stilkselleri, sommer/høst	7	6.1	5.3	4.4	3.5	3.0	2.8	2.4	2.0	1.7
Knollselleri, sommer/høst	8	7	6	5	4	3.5	3.1	2.8	2.5	2.1