

Velkommen til Høyspenten Barnehage

Blåmeis Alitgaccer

Art: *Parus caeruleus*
Lengde: 11,5 cm



Nykommer i Finnmark som ses her og der gjennom vinteren.
Funnet hekkende et fåttal steder i fylket.

Granmeis Vuovdegaccer

Art: *Parus montanus*
Lengde: 12 – 13 cm

Ensfarget grå underside og litt mørkere grå overside.
Svart hette på hodet og svart strupeflekk.
Lyse felter på vingene.

Oppholder seg i Norge hele året, og spiser solsikkefrø og fett på fôringsslassen.
Vanlig i Finnmark.



Bjørkefink Vintán

Art: *Fringilla montifringilla*
Lengde: 14 – 16 cm

Bjørkefinkhannen er kanskje en av våre vakreste spurvefugler. Hodet er skinnende svart, og står i skarp kontrast til det oransje brystet og den hvite undersiden. Oversiden er spraglet i svart og hvitt. Hunnen er mer anonymt farget, og overvintrende hanner er ofte farget som hunnen.

På fôringsslassen ved ankomst til hekkeområdene på vårvinteren.



FUGLENE PÅ FÔRINGSSPLASSEN VÅR

Kjøttmeis Fiskesgaccer

Art: *Parus major*
Lengde: 14 cm

Skinnende blåsvart hode med stort hvitt kinnett. Gråblå vinger med smalt, hvitt vingebånd. Gul kropp med svart bånd fra strupen og ned til undergumpen.

Kjøttmeisen er den største av meisene, og en av de vanligste gjestene på fôringsslassen. Spiser både solsikkefrø og fett. Trives i Norge hele året.

Lappmeis Gaccepas̄

Art: *Parus cinctus*
Lengde: 12,5 – 14 cm

Ligner granmeisen, men har brun hette og store svart strupeflekk. Kropssidene rustbeige.

Vanlig i barskogområdene og i frodig bjørkeskog.



Grønnfink Ruoanáeibbos̄

Art: *Carduelis chloris*
Lengde: 15 cm

En av de vanligste fuglene på fôringsslassen, og kommer ofte i flokker. Hannen har eplegrønn fjærdrakt, grønne vinger med gult langs-gående felt og gul og svart stjert. Nebbet er kraftig og lyst.

Grønnfinken er solsikkespesialisten på fôringsslassen, og en flokk kan spise flere kilo på kort tid. Mange trekker til Danmark og Mellom-Europa om vinteren, men de fleste blir igjen i Norge.

Pilfink Uhcašilljocihci

Art: *Passer montanus*
Lengde: 14 cm

Ganske lik gråspurven, men har brun hette på hodet, og en svart flekk ved kinnet.

Pilfinken ses sjeldent i Finnmark, men kan dukke opp her og der.

Pilfinken spiser mest solsikke og fett på fôringsslassen. Den er i Norge hele året.



Bokfink Beibbos̄

Art: *Fringilla coelebs*
Lengde: 14 – 16 cm

Hannen har dyprodt underside, blågrått hode og nebb og svart panneflekk.

Hunnen er ensfarget gråbrun. Begge kjønn har hvitt vingebånd og grågrønn overgump.

Bokfinken er en av Norges vanligste fugler, men en nykommer i Pasvik. Når bokfinken kommer i april/mai spiser den solsikkefrø på fôringsslassen.



Gråtrost Ránesrásttis

Art: *Turdus pilaris*
Lengde: 26 cm

Stor, lang og spraglete trost. Hode og overgump er grå, vingene rødbruner og undersiden lys gulbeige med tallrike mørke flekker. Kjønner like.

Vanlig hekkefugl i Finnmark, men kun et fåttal overvintrer i fylket. Vanligst winterstid i år med mye rognbær. Spiser epler og annen frukt på fôringsslassen.



Grønnsisik Ruonáczás

Art: *Carduelis spinus*
Lengde: 11 – 12 cm

Grønnsisiken er det nærmeste vi kommer en norsk kanarifugl! Hannen har gult hode og bryst, grøn rygg, svart panne og isse og to kraftige, gule vingebånd. Hunnen er mer anonymt farget, og mangler svart panne og isse.

Nykommer i Finnmark. Grønnsisiken kommer vanligvis til fôringsslassen i små flokker, og antallet kan variere fra år til år. Mange trekker til Belgia, Tyskland og Nederland om vinteren. Den spiser mest solsikkefrø, frøblanding og matrester.



Dompap Ruksesruivil

Art: *Pyrrhula pyrrhula*
Lengde: 15 – 17 cm

Julekortmotiv nummer én, takket være hannens julerøde underside. Hunnen har en mer gråbrun underside. Begge kjønn har svart hette, hvit overgump og et kraftig, svart nebb.

Antall dompap varierer fra år til år og med mengden tilgjengelige frø i skogen. Ankommer fôringsslassen vanligvis først etter at snøen har kommet, og spiser da hovedsakelig solsikkefrø.



Sidenvans Bealljerásttis

Art: *Bombycilla garrulus*
Lengde: 19 cm

Lett å kjenne på sin grårosa fjærdrakt med lang issetopp, svart strupe og øyenstripe, samt gule, hvite og røde tegninger på vingene. Arten minner om stor, men avsløres ofte på ringlene solvlokkestemme og rask bufeformet flukt. Sidenvansen er en typisk invasjonsfugl og antall individer varierer i stor grad fra år til år. Om sommeren lever sidenvansen tilbaketrukket i nordlige barskoger, der den jakter på insekter. Høst og vinter flyr arten imidlertid omkring i større flocker på jakt etter rognbær. Besøker ofte hager og parker og er da lite sky.



Snøspurv Állat

Art: *Plectrophenax nivalis*
Lengde: 17 cm

Hannen har hvitt hode, hvitt underside og hvit overgump.

Svart rygg og svarte vinger med hvite felt. Hunnen har mindre kontrastrik med gråbrunt hode og spraglete rygg. Kan i Finnmark opptre i store flokker under vårtrekket i begynnelsen av april; også på fôringsslassen.

Hekker i blokkmark og steiner med svært lite vegetasjon; enten på snaujellet eller helt nede i fjærsteinene.



Gråsisik Ummolcizás

Art: *Carduelis flammea*
Lengde: 12 – 13 cm

Liten og sosial finkfugl, som vanligvis ankommer fôringsslassen i flokk.

Utseendet varierer noe, men de fleste er gråspraglet både på over- og underside. Hannen har rødt bryst. Det viktigste kjennetegnet er det røde «kastermet» i panna som begge kjønn har hele året. Gråsisiken varierer i antall fra år til år, og kan enkelte år mangle helt. Den spiser solsikkefrø på fôringsslassen.



Kråke Vuoražas

Art: *Corvus corone*
Lengde: 37 – 41 cm

Grå underside, svarte vinger og svart hode og brystflekk. Kråke er en fast gjest på fôringsslassen, men den er ganske sky og er ofte borte når det er mennesker i nærheten.



Skjære Skire

Art: *Pica pica*
Lengde: 44 – 46 cm

En fugl av alle kjenner godt, kledd i kjole og hvitt! Svart rygg og hode, stort hvitt haleflekk og hvit buk. Lang stjert glinsende i metallgrønt og fiolett.




Gråspurv Šilljochci

Art: *Passer domesticus*
Lengde: 14 cm

En selskapelig fugl som trives på fôringsslassen og blant folk. Hannen har ensfarget grå underside med antydning til svart strupeflekk. Grå isse med kastanjebrune sider.

Tykt, gulgrått nebb. Kastanjebrun rygg med hvite vingebånd. Hunnen er mer ensfarget gråbrun.

Spiser fro, knopper, rotter og bær. Besøker fuglebrettet og tar gjerne både solsikkefrø, havre, nøtter og fett.



Polarsisik Vilgesummolcizás

Art: *Carduelis hornemannii*
Lengde: 12 – 14 cm

Svært lik gråsisik. Stor ulflekkt hvit overgump. Kun få og smale mørke stripet på kroppssidene. Gir et lyft helhetstrykk.

Ses hele året, men er vanligst på fôringsslassen fra mars og fram mot sommeren.



Konglebit Stálobeibbos̄

Art: *Pinicola enucleator*
Lengde: 19 – 22 cm

Hannen vakkert rød med doble hvite vingebånd. Hunnen grågrønnorange. Kraftig nebb.



Stær Stárra

Art: *Sturnus vulgaris*
Lengde: 21 cm

Blåsvart kropp med grønn og fiolett glans og lyse prikker. Knallgult nebb. Samles ofte i store flokker om etter sommeren. Bor i Sør-Europa om vinteren. Stæren er en mester i å lage lyder og kan hørne andre. Hører du en katt i toppen av et tre, er det sannsynligvis en stær du hører.



For mer informasjon om fugler på fôringsslassen, gå inn på www.bioforsk.no/fugleturisme eller kontakt oss på mail: fugleforing@bioforsk.no

Denne tavla viser fugler som mer eller mindre fast kan oppleves rundt fôringsslassen. Noen er her bare om våren eller høsten, andre kan sees hele året. Felles for dem alle er at de trenger mat for å overleve. Om vinteren er dagene kortere og temperaturen lavere – noe som gjør at fuglene er nødt til å bruke dagen til å finne nok mat til å overleve natta. Ved å legge ut mat hele vinteren kan vi bidra til at de overlever helt til våren kommer. På fôringsslassen bør det være nok solsikkefrø hele året, de fleste artene foretrekker de energirike solsikkefrøene framfor annet i vinterhalvåret. I tillegg er jordnøtter fin mat for meiser, sisiker, spetter, spurver og finker. I kalde perioder foretrekker også enkelte arter, som f.eks. kjøttmeis, fett og talg. Hirsefrø, hvete, bygg, havre, frukt og bær er også mat vi kan tilby fuglene. Husk at all mat til fuglene skal være usaltet.

