

Velkommen til Kokelv

Bo~ og servicesenter

Blåmeis Alitgaccer

Art: *Parus caeruleus*
Lengde: 11,5 cm

Blå vinger med hvite vingebånd.
Klarblå kalott omgitt av hvitt.
Svarte øyestriper.
Hvite kinneflekk.
Mattgul underside,
med tynn stripe på buken.

Nykommer i Finnmark som ses her og der gjennom vinteren.
Funnet hekkende et fåttal steder i fylket.



Bjørkefink Vintán

Art: *Fringilla montifringilla*
Lengde: 14 – 16 cm

Bjørkefinkhannen
er kanskje en av våre vakreste
spurvefugler. Hodet er skinnende
svart, og står i skarp kontrast til
det oransje brystet og den hvite
undersiden. Oversiden er spraglet
i svart og hvitt. Hunnen er mer
anonymt farget, og overvintrende hanner
er ofte farget som hunnen.

På fôringsslassen ved ankomst til hekkeområdene på
vårvinteren.



Granmeis Vuovdegaccer

Art: *Parus montanus*
Lengde: 12 – 13 cm

Ensfarget grå underside
og litt mørkere grå overside.
Svart hette på hodet og svart
strukkeflekk.
Lyse felter på vingene.

Oppholder seg i Norge hele året,
og spiser solsikkefrø og fett
på fôringsslassen.
Vanlig i Finnmark.



Bokfink Beibbos

Art: *Fringilla coelebs*
Lengde: 14 – 16 cm

Hannen har dyprod
underside, blågrått hode
og nebb og svart
strukkeflekk.

Hunnen er ensfarget gråbrun.
Begge kjønn har to hvite vingebånd
og grågrønn overgump.

Bokfinken er en av Norges vanligste fugler,
men en nykommer i Pasvik. Når bokfinken kommer
i april/mai spiser den solsikkefrø på fôringsslassen.



Kjøttmeis Fiskesgaccer

Art: *Parus major*
Lengde: 14 cm

Skinnende blåsvart hode
med stort hvitt kinnet.
Gråblå vinger med smalt, hvitt vingebånd.
Gul kropp med svart bånd fra strupen
og ned til undergumpen.

Kjøttmeisen er den største av meisene, og en av de vanligste
gjestene på fôringsslassen. Spiser både solsikkefrø og fett.
Trives i Norge hele året.



Grønnfink Ruoanáeibeibbos

Art: *Carduelis chloris*
Lengde: 15 cm

En av de vanligste
fuglene på fôringsslassen,
og kommer ofte i flokker.
Hannen har eplegrønn fjærdrakt,
grønne vinger med gult langs-
gående felt og gul og svart stjert.
Nebbet er kraftig og lyst.

Grønnfinken er solsikkespesialisten på fôringsslassen, og en flokk
kan spise flere kilo på kort tid. Mange trekker til Danmark og
Mellom-Europa om vinteren, men de fleste blir igjen i Norge.



Lappmeis Gaccepaš

Art: *Parus cinctus*
Lengde: 12,5 – 14 cm

Ligner granmeisen, men har
brun hette og store svart
strukkeflekk.
Kroppssidene
rustbeige.

Vanlig i barskogområdene og i frodig bjørkeskog.



Pilfink Uhcašilljocihci

Art: *Passer montanus*
Lengde: 14 cm

Ganske lik gråspurven,
men har brun hette på hodet,
og en svart flekk ved kinnet.

Pilfinken ses sjeldent i Finnmark
men kan dukke opp her og der.

Pilfinken spiser mest solsikke og fett på fôringsslassen.
Den er i Norge hele året.



FUGLENE PÅ FÔRINGSSPLASSEN VÅR

Denne tavla viser fugler som mer eller mindre fast kan oppleves rundt fôringsslassen. Noen er her bare om våren eller høsten, andre kan sees hele året. Felles for dem alle er at de trenger mat for å overleve. Om vinteren er dagene kortere og temperaturen lavere – noe som gjør at fuglene er nødt til å bruke dagen til å finne nok mat til å overleve natta. Ved å legge ut mat hele vinteren kan vi bidra til at de overlever helt til våren kommer.

På fôringsslassen bør det være nok solsikkefrø hele året, de fleste artene foretrekker de energirike solsikkefrøene framfor annet i vinterhalvåret. I tillegg er jordnøtter fin mat for meiser, sisiker, spetter, spurver og finker.

I kalde perioder foretrekker også enkelte arter, som f.eks. kjøttmeis, fett og talg. Hirsefrø, hvete, bygg, havre, frukt og bær er også mat vi kan tilby fuglene. Husk at all mat til fuglene skal være usaltet.



KVALSUND KOMMUNE

Stabbursnes Naturhus
og Museum



Gråtrost Ráanesrásttis

Art: *Turdus pilaris*
Lengde: 26 cm

Stor, lang og spraglete trost.
Hode og overgump er grå,
vingene rødbrun og
undersiden lys gulbeige
med tallrike mørke flekker.
Kjønner like.

Vanlig hekkefugl i Finnmark, men kun
et fåttal overvintrer i fylket. Vanligst vinterstid i år med mye rogn-
nebær. Spiser epler og annen frukt på fôringsslassen.



Grønnsisik Ruonáczás

Art: *Carduelis spinus*
Lengde: 11 – 12 cm

Grønnsisiken er det nærmeste
vi kommer en norsk kanarifugl!
Hannen har gult hode og bryst, grøn rygg,
svart panne og isse og to kraftige,
gule vingebånd. Hunnen er mer anonymt farget,
og mangler svart panne og isse.

Nykommer i Finnmark. Grønnsisiken kommer vanligvis til fôringsslassen
i små flokker, og antallet kan variere fra år til år. Mange
trekker til Belgia, Tyskland og Nederland om vinteren. Den spiser
mest solsikkefrø, frøblanding og matrester.



Dompap Ruksesruivil

Art: *Pyrrhula pyrrhula*
Lengde: 15 – 17 cm

Julekortmotiv nummer én,
takket være hannens julerøde
underside. Hunnen har en mer
gråbrun underside.
Begge kjønn har svart hette,
hvitt overgump og et kraftig,
svart nebb.

Antall dompap varierer fra år til år og med mengden tilgjengelige
frø i skogen. Ankommer fôringsslassen vanligvis først etter at
snøen har kommet, og spiser da hovedsakelig solsikkefrø.



Sidenvans Bealljerásttis

Art: *Bombycilla garrulus*
Lengde: 19 cm


Lett å kjenne på sin grårosa
fjærdrakt med lang issetopp,
svart strepe og øyenstripe, samt
gule, hvite og røde tegninger på vingene.
Arten minner om star, men avsløres ofte
på ringlene solvlokkestemme og rask
budeformet flukt. Sidenvansen er en typisk invasjonsfugl og antall
individvarierer i stor grad fra år til år. Om sommeren lever sidenvansen
tilbaketrukket i nordlige barskoger, der den jakter på insekter.
Høst og vinter flyr arten imidlertid omkring i større flocker på jakt
etter rognbær. Besøker ofte hager og parker og er da lite sky.



Snøspurv Állat

Art: *Plectrophenax nivalis*
Lengde: 17 cm

Hannen har hvitt hode,
hvitt underside og hvitt overgump.
Svart rygg og svarte vinger med hvite felt.
Hunnen har mindre kontrast mellom gråbrunt hode og spraglete rygg.
Kan i Finnmark oppføre i store flokker under vårtrekket i begynnelsen
av april; også på fôringsslassen.



Gråsisik Ummolcizás

Art: *Carduelis flammea*
Lengde: 12 – 13 cm

Liten og sosial finkfugl,
som vanligvis ankommer
fôringsslassen i flokk.

Utseendet varierer noe, men de fleste er
gråspraglet både på over- og undersiden.
Hannen har rødt bryst. Det viktigste kjennetegnet
er det røde «kastermet» i panna som begge kjønn har hele året.
Gråsisiken varierer i antall fra år til år, og kan enkelte år mangle helt.
Den spiser solsikkefrø på fôringsslassen



Kråke Vuoražas

Art: *Corvus corone*
Lengde: 37 – 41 cm

Grå underside, svarte vinger
og svart hode og brystflekk.
Kråke er en fast gjest på fôringsslassen,
men den er ganske sky
mensker, og er ofte borte
når det er mennesker i
nærheten.



Skjære Skire

Art: *Pica pica*
Lengde: 44 – 46 cm

En fugl av alle kjenner godt, kledd i kjole og hvitt!
Svart rygg og hode, stort
hvitt halsflekk og hvit buk.
Lang stjert glinsende
i metallgrønt og fiolett.

Innombanlig fôringsslassen titt og ofte, og spiser stort sett alt som
er tilgjengelig. Overnatter i små grupper, og er i Norge hele året.



Gråspurv Šilljochci

Art: *Passer domesticus*
Lengde: 14 cm

En selskapelig fugl som trives
på fôringsslassen og blant folk.
Hannen har ensfarget grå under-
side med antydning til svart strupeflekk.
Grå isse med kastanjebrune sider.
Tykt, gulgrått nebb. Kastanjebrun rygg med hvite vingebånd.
Hunnen er mer ensfarget gråbrun.



Polarsisik Vilgesummolcizás

Art: *Carduelis hornemannii*
Lengde: 12 – 14 cm

Svært lik gråsisik.
Stor uleftek hvitt overgump.
Kun få og smale mørke
striper på kroppssidene.
Gir et lyst helhetstrykk.



Ses hele året, men er vanligst på fôringsslassen fra mars
og fram mot sommeren.

Linerle Béstör

Art: *Motacilla alba*
Lengde: 18 cm

Slank fugl med svært lang
stjert. Grå overside
og hvit underside.

Svart strepe, isse og nakke; hvite kinn
og halssider. Ungfuglene mindre kontrastrike.
Trekfugl som ankommer Finnmark i siste halvdel av april.
Vanlig i nærheten av bebyggelse.
Tripper rundt og vippa karakteristisk med stjerten.



Stær Stárra

Art: *Sturnus vulgaris*
Lengde: 21 cm

Blåsvart kropp med gronn
og fiolett glans og lyse prikker.
Knalagt nebb.
Samles ofte i store flokker om
etter sommeren.
Stæren er en mester i å lage lyder
og kan herme andre. Hører du en
katt i toppen av et tre, er det
sannsynligvis en stær du hører.



Vil du vite mer om fuglelivet her? Ta kontakt med Stabbursnes Naturhus og Museum på www.stabbursnes.no