

# Velkommen til Boftsa Barnehage

## Blåmeis Alitgaccet

Art: *Parus caeruleus*  
Lengde: 11,5 cm

Blå vinger med hvite vingebånd. Klarblå kalott omgitt av hvitt. Svarte øyestriper. Hvite kinnfelt. Mattgul underside, med tynn stripe på buken.

Nykommer i Finnmark som ses her og der gjennom vinteren. Funnet hekkende et fåtall steder i fylket.



## Bjørkefink Vintán

Art: *Fringilla montifringilla*  
Lengde: 14 – 16 cm

Bjørkefinkhannen er kanskje en av våre vakreste spurvefugler. Hodet er skinnende svart, og står i skarp kontrast til det oransje brystet og den hvite undersiden. Oversiden er spraglet i svart og hvitt. Hunnen er mer anonymt farget, og overvintrende hanner er ofte farget som hunnen.

På føringsplassen ved ankomst til hekkeområdene på vårvinteren.



## FUGLENE PÅ FØRINGSPLASSEN VÅR

## Granmeis Vuovdegaccet

Art: *Parus montanus*  
Lengde: 12 – 13 cm

Ensufarvet grå underside og litt mørkere grå overside. Svart hette på hodet og svart strupeflekk. Lyse felter på vingene.

Oppholder seg i Norge hele året, og spiser solsikkefrø og fett på føringsplassen. Vanlig i Finnmark.




## Kjøttmeis Fiskesgaccet

Art: *Parus major*  
Lengde: 14 cm

Skinnende blåsvart hode med stort hvitt kinnfelt. Gråblå vinger med smalt, hvitt vingebånd. Gul kropp med svart bånd fra strupen og ned til undergumpen.

Kjøttmeisen er den største av meisene, og en av de vanligste gjestene på føringsplassen. Spiser både solsikkefrø og fett. Trives i Norge hele året.



## Lappmeis Gaccepaš

Art: *Parus cinctus*  
Lengde: 12,5 – 14 cm

Ligner granmeisen, men har brun hette og større svart strupeflekk. Kroppssidene rustbeige.

Vanlig i barskogområdene og i frodig bjørkeskog.



## Grønnfink Ruonábeibboš

Art: *Carduelis chloris*  
Lengde: 15 cm

En av de vanligste fuglene på føringsplassen, og kommer ofte i flokker. Hannen har eplegrønn fjædrakt, grønne vinger med gult langs-gående felt og gul og svart stjert. Nebbet er kraftig og lyst.

Grønnfinken er solsikkespesialisten på føringsplassen, og en flokk kan spise flere kilo på kort tid. Mange trekker til Danmark og Mellom-Europa om vinteren, men de fleste blir igjen i Norge.



## Pilfink Uhcašilljocihci

Art: *Passer montanus*  
Lengde: 14 cm

Ganske lik gråspurven, men har brun hette på hodet, og en svart flekk ved kinnet.

Pilfinken ses sjelden i Finnmark men kan dukke opp her og der.

Pilfinken spiser mest solsikke og fett på føringsplassen. Den er i Norge hele året.



## Snøspurv Állat

Art: *Plectrophenax nivalis*  
Lengde: 17 cm

Hannen har hvitt hode, hvit underside og hvit overgump. Svart rygg og svarte vinger med hvite felt. Hunnen er mindre kontrastrik med gråbrunt hode og spraglede rygg. Kan i Finnmark opptre i store flokker under vårtrekket i begynnelsen av april, også på føringsplassen. Hekker i blokkmark og steinur med svært lite vegetasjon; enten på snaufjellet eller helt nede i fjæresteinene.



## Gulspurv Fiskescihci

Art: *Emberiza citrinella*  
Lengde: 16 cm

Meget vakker fugl. Gul med svarte og rødbrune streker på ryggen. Svartaktig stjert med hvite ytterkanter. Rustrodd overgump.

Kommer til foringsplassen i flokker, og er den eneste av artene her som foretrekker havre og julenøk foran solsikkefrø. I Norge hele året.




## Gråspurv Šilljochci

Art: *Passer domesticus*  
Lengde: 14 cm

En selskapelig fugl som trives på føringsplassen og blant folk. Hannen har ensfarget grå underside med antydning til svart strupeflekk. Grå isse med kastanjebrune sider. Tykt, gulgrått nebb. Kastanjebrun rygg med hvite vingebånd. Hunnen er mer ensfarget gråbrun.

Spiser frø, knopper, røtter og bær. Besøker fuglebrettet og tar gjerne både solsikkefrø, havre, nøtter og fett.



## Grønnsisik Ruonácizáš

Art: *Carduelis spinus*  
Lengde: 11 – 12 cm

Grønnsisiken er det nærmeste vi kommer en norsk kanarifugl! Hannen har gult hode og bryst, grønn rygg, svart panne og isse og to kraftige, gule vingebånd. Hunnen er mer anonymt farget, og mangler svart panne og isse.

Nykommer i Finnmark. Grønnsisiken kommer vanligvis til føringsplassen i små flokker, og antallet kan variere fra år til år. Mange trekker til Belgia, Tyskland og Nederland om vinteren. Den spiser mest solsikkefrø, frøblanding og matrester.



## Gråsisik Ummolcizáš

Art: *Carduelis flammea*  
Lengde: 12 – 13 cm

Liten og sosial finkefugl, som vanligvis ankommer føringsplassen i flokk.

Utseendet varierer noe, men de fleste er gråspraglet både på over- og undersiden. Hannen har rødt bryst. Det viktigste kjennetegnet er det røde «kastemerket» i panna som begge kjønn har hele året. Gråsisiken varierer i antall fra år til år, og kan enkelte år mangle helt. Den spiser solsikkefrø på føringsplassen



## Polarsisik Vilgesummolcizáš

Art: *Carduelis hornemanni*  
Lengde: 12 – 14 cm

Svært lik gråsisik. Stor uflekket hvit overgump. Kun få og smale mørke striper på kroppssidene. Gir et lyst helhetsinntrykk.

Ses hele året, men er vanligst på føringsplassen fra mars og fram mot sommeren.



Denne tavla viser fugler som mer eller mindre fast kan oppleves rundt føringsplassen. Noen er her bare om våren eller høsten, andre kan sees hele året. Felles for dem alle er at de trenger mat for å overleve. Om vinteren er dagene kortere og temperaturen lavere – noe som gjør at fuglene er nødt til å bruke dagen til å finne nok mat til å overleve natta. Ved å legge ut mat hele vinteren kan vi bidra til at de overlever helt til våren kommer.

På føringsplassen bør det være nok solsikkefrø hele året, de fleste artene foretrekker de energirike solsikkefrøene framfor annet i vinterhalvåret. I tillegg er jordnøtter fin mat for meiser, sisiker, spetter, spurver og finker.

I kalde perioder foretrekker også enkelte arter, som f.eks. kjøttmeis, fett og talg. Hirsefrø, hvete, bygg, havre, frukt og bær er også mat vi kan tilby fuglene. Husk at all mat til fuglene skal være usaltet.



TANA KOMMUNE

## Dompap Ruksesruivil

Art: *Pyrrhula pyrrhula*  
Lengde: 15 – 17 cm

Julekortmotiv nummer én, takket være hannens julerøde underside. Hunnen har en mer gråbrun underside. Begge kjønn har svart hette, hvit overgump og et kraftig, svart nebb.


Antall dompap varierer fra år til år og med mengden tilgjengelige frø i skogen. Ankommer føringsplassen vanligvis først etter at snøen har kommet, og spiser da hovedsakelig solsikkefrø.



## Sidensvans Bealljerásttis

Art: *Bombicilla garrulus*  
Lengde: 19 cm

Lett å kjenne på sin grårosa fjædrakt med lang issetopp, svart strupe og øyestripe, samt gule, hvite og røde tegninger på vingene. Arten minner om stær, men avsløres ofte på ringlende sølvklokkestemme og rask buetformet flukt. Sidensvansen er en typisk invasjonfugl og antall individer varierer i stor grad fra år til år. Om sommeren lever sidensvansen tilbaketrukket i nordlige barskoger, der den jakter på insekter. Høst og vinter flyr arten imidlertid omkring i større flokker på jakt etter rognebær. Besøker ofte hager og parker og er da lite sky.



## Skjære Skire

Art: *Pica pica*  
Lengde: 44 – 46 cm

En fugl de aller fleste kjenner godt, kledd i kjole og hvitt! Svart rygg og hode, stort hvitt skulderfelt og hvit buk. Lang stjert glinsende i metallgrønt og fiolett.

Innom føringsplassen titt og ofte, og spiser stort sett alt som er tilgjengelig. Overnatter i små grupper, og er i Norge hele året.



## Stær Stárra

Art: *Sturnus vulgaris*  
Lengde: 21 cm

Blåsvart kropp med grønn og fiolett glans og lyse prikker. Knallgult nebb. Samles ofte i store flokker om etter-sommeren. Bor i Sør-Europa om vinteren. Stæren er en mester i å lage lyder og kan herme andre. Hører du en katt i toppen av et tre, er det sannsynligvis en stær du hører.



For mer informasjon om fugler på føringsplassen, gå inn på [www.bioforsk.no/fugleturisme](http://www.bioforsk.no/fugleturisme) eller kontakt oss på mail: [fugleforing@bioforsk.no](mailto:fugleforing@bioforsk.no)