



Protokoll for prøveuttak for testing av smitte av gulrotsjukdommer (Jordprøver og gulrotjord-prøver)

Jordprøver om våren (eller høsten for vurdering av areal til bruk året etter):

Ta ut jord fra 0 til ca 20 cm dybde på 25 punkter jevnt fordelt utover arealet prøven skal representere (ca 10 dekar). Bruk et jordbor og ta et stikk på hvert punkt med 20 m avstand. Jorden samles i en bøtte/pose og **blandes veldig godt sammen**. Ta ut ca 500 ml av dette og legg det i en pose/eske som er godt merket med **prøvekode (og eventuelt dato for prøveuttak)**.

Gulrotjord:

Jord som sitter på 50 gulrøtter før høsting:

Samle gulrotjord fra 25 punkter jevnt fordelt utover hele arealet som prøven skal representere (normalt ca 10 dekar). Ta opp 2 gulrøtter ved hvert punkt (20 m avstand = 25 punkter). Hvis det er mye jord på røttene skrapes den ytterste jorden av før den aller innerste jorden børstes ned i en liten pose/boks som er godt merket med **prøvekode (og eventuelt dato for prøveuttak)**. Hele prøven (fra alle 50 røtter) skal minst være i størrelsesorden 20 - 30 ml jord (en stor spiseskje).

Jordprøvene med følgebrev sendes til: Planteklinikken, Bioforsk Plantehelse, Høgskoleveien 7, N-1432 Ås
Merk prøven "Gulrotsjukdomstest"